

В Калининском районе Санкт-Петербурга в 2015 году на диспансерном учете состояло 96 пациентов с ВИЧ-инфекцией и активным туберкулезом.

Цель работы — выявление особенностей проводимого у больных противотуберкулезного лечения и лечения от ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Были изучены случаи лечения всех 96 человек с активным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Больные были разделены на две группы.

Первая группа состояла из пациентов с длительностью туберкулезного лечения не более двух лет так называемый «впервые выявленный туберкулез». Таких больных оказалось 47 человек (48,96%).

Вторую группу пациентов составили 49 человек (51,04%) с хроническим туберкулезом, а также с обострением или рецидивом туберкулезного процесса, лечение которых длится более двух лет.

В первой группе у 76,60% (36 человек) приверженность к противотуберкулезному лечению оказалась довольно высокой. Пациенты эффективно лечатся в стационарах, санаториях и амбулаторно.

Среди пациентов второй группы только 46,94% (23 человека) активно участвовали в собственном выздоровлении.

В первой группе в антиретровирусной терапии (АРВТ) нуждались только 43 пациента. Приверженность к АРВТ встречалась среди этих пациентов в 60,47% случаев (26 человек). Во второй группе приверженность к АРВТ наблюдали всего у 17 человек (34,69%).

Заключение. Пациенты с хроническим туберкулезом реже проявляли как приверженность к противотуберкулезной терапии, так и приверженность к АРВТ (в 1,6 и 1,7 раза соответственно). При этом одним из основных факторов профилактики развития активного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц остается проведение АРВТ.

О реализации приоритетного национального проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» в Орловской области
Г.Л.Захарченко, В.И.Зайцева, Л.Н.Замулина,
О.Г.Захарченко
(Орел, Россия)

Одним из основных направлений в деятельности Управления Роспотребнадзора по Орловской области является усиление профилактических мер борьбы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила сложившаяся эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Орловской области, по данным статистической отчетной формы № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» и результатам проведенного ретроспективного анализа заболеваемости

ВИЧ-инфекцией. Проведена оценка эффективности проводимых мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории Орловской области.

Результаты. По состоянию на 01.09.2016 г. в Орловской области зарегистрировано 2389 случаев ВИЧ-инфекции среди постоянно проживающих местных жителей (0,3% от всего населения). За 8 месяцев 2016 года выявлено 205 новых случаев ВИЧ-инфекции (аналогичный период 2015 г. — 184 случая), показатель заболеваемости составил 26,9 на 100 тысяч населения, что больше уровня 2015 года (23,9) на 12,5% и ниже показателя по РФ (39,5) на 31,9%. Угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (52,4% от общего числа выявленных на 01.09.2016 г.). Отмечается тенденция увеличения выявляемости ВИЧ-инфекции среди более старших возрастных групп населения: 30–39 лет, 40 лет и старше, на долю которых в 2016 году приходится 45,9 и 22% соответственно. Благодаря реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявления и лечения больных ВИЧ» в области в 2015 году удалось достичь увеличения охвата диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ до 95,2%, 3-этапной химиопрофилактикой перинатальной передачи ВИЧ-инфекции до 90,5%, повысить приверженность больных к лечению антиретровирусной терапией до 680 ВИЧ-инфицированных.

Заключение. С целью стабилизации показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 году в области планируется проведение обследования на ВИЧ-инфекцию 152 тысяч человек; лечения 790 ВИЧ-инфицированных, охвата химиопрофилактикой не менее 95% пар мать-ребенок. Актуальной проблемой в области остается лечение больных с сочетанными формами ВИЧ-инфекции.

Поражение сердечно-сосудистой системы у больных с ВИЧ-инфекцией

О.Н.Леонова, Е.А.Жукова, А.С.Шеломов, Е.В.Степанова,
Н.Л.Смирнова
(Санкт-Петербург, Россия)

В Санкт-Петербурге с 1987-го по 01.01.2016 года выявлены 51 834 случая ВИЧ-инфекции у жителей города. В последние годы в связи с удлинением сроков жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией сердечно-сосудистая патология постепенно начинает занимать значимое место. В эру противовирусной терапии возникновение сердечно-сосудистых осложнений может быть обусловлено не только наличием ВИЧ-инфекции, но и приемом лекарственных средств.

Цель: изучение заболевания сердечно-сосудистой системы как коморбидного состояния у пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на стационарном лечении в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. Были проанализированы 8451 история болезни пациентов, которые прошли стационарное лечение в Центре СПИД с 2010 по 2014 год в стадии 4А, Б, В+5.